

#### Datos de alarma obstétrica

- \*El bebé no se mueve después de comer.
- \*Dolor de cabeza constante, escuchar zumbidos, ver lucecitas.
- \*Salida de sangre o líquido.
- \*Tener 4 o más contracciones en 10 min y que tengan duración de 45 seg a 1 min cada una.
- \*Fiebre mayor a 38°C.
- \*Molestia al orinar y presencia de sangre en la orina.



#### Datos de alarma obstétrica

- \*El bebé no se mueve después de comer.
- \*Dolor de cabeza constante, escuchar zumbidos, ver lucecitas.
- \*Salida de sangre o líquido.
- \*Tener 4 o más contracciones en 10 min y que tengan duración de 45 seg a 1 min cada una.
- \*Fiebre mayor a 38°C.
- \*Molestia al orinar y presencia de sangre en la orina.



#### Datos de alarma obstétrica

- \*El bebé no se mueve después de comer.
- \*Dolor de cabeza constante, escuchar zumbidos, ver lucecitas.
- \*Salida de sangre o líquido.
- \*Tener 4 o más contracciones en 10 min y que tengan duración de 45 seg a 1 min cada una.
- \*Fiebre mayor a 38°C.
- \*Molestia al orinar y presencia de sangre en la orina.



#### Datos de alarma obstétrica

- \*El bebé no se mueve después de comer.
- \*Dolor de cabeza constante, escuchar zumbidos, ver lucecitas.
- \*Salida de sangre o líquido.
- \*Tener 4 o más contracciones en 10 min y que tengan duración de 45 seg a 1 min cada una.
- \*Fiebre mayor a 38°C.
- \*Molestia al orinar y presencia de sangre en la orina.



#### Datos de alarma obstétrica

- \*El bebé no se mueve después de comer.
- \*Dolor de cabeza constante, escuchar zumbidos, ver lucecitas.
- \*Salida de sangre o líquido.
- \*Tener 4 o más contracciones en 10 min y que tengan duración de 45 seg a 1 min cada una.
- \*Fiebre mayor a 38°C.
- \*Molestia al orinar y presencia de sangre en la orina.



#### Datos de alarma obstétrica

- \*El bebé no se mueve después de comer.
- \*Dolor de cabeza constante, escuchar zumbidos, ver lucecitas.
- \*Salida de sangre o líquido.
- \*Tener 4 o más contracciones en 10 min y que tengan duración de 45 seg a 1 min cada una.
- \*Fiebre mayor a 38°C.
- \*Molestia al orinar y presencia de sangre en la orina.



#### Datos de alarma obstétrica

- \*El bebé no se mueve después de comer.
- \*Dolor de cabeza constante, escuchar zumbidos, ver lucecitas.
- \*Salida de sangre o líquido.
- \*Tener 4 o más contracciones en 10 min y que tengan duración de 45 seg a 1 min cada una.
- \*Fiebre mayor a 38°C.
- \*Molestia al orinar y presencia de sangre en la orina.



#### Datos de alarma obstétrica

- \*El bebé no se mueve después de comer.
- \*Dolor de cabeza constante, escuchar zumbidos, ver lucecitas.
- \*Salida de sangre o líquido.
- \*Tener 4 o más contracciones en 10 min y que tengan duración de 45 seg a 1 min cada una.
- \*Fiebre mayor a 38°C.
- \*Molestia al orinar y presencia de sangre en la orina.



#### Datos de alarma obstétrica

- \*El bebé no se mueve después de comer.
- \*Dolor de cabeza constante, escuchar zumbidos, ver lucecitas.
- \*Salida de sangre o líquido.
- \*Tener 4 o más contracciones en 10 min y que tengan duración de 45 seg a 1 min cada una.
- \*Fiebre mayor a 38°C.
- \*Molestia al orinar y presencia de sangre en la orina.



#### Datos de alarma obstétrica

- \*El bebé no se mueve después de comer.
- \*Dolor de cabeza constante, escuchar zumbidos, ver lucecitas.
- \*Salida de sangre o líquido.
- \*Tener 4 o más contracciones en 10 min y que tengan duración de 45 seg a 1 min cada una.
- \*Fiebre mayor a 38°C.
- \*Molestia al orinar y presencia de sangre en la orina.

